


PREPORUČENI SKRINING TESTOVI:

- test na okultno krvarenje (najjednostavniji, najčešće primenjivan, analizira se stolica na prisustvo krvi);
- sigmoidoskopija i kolonoskopija (pregled creva kamerom, koristi se kada je skrining test na okultno krvarenje pozitivan).

SKRINING SPAŠAVA ŽIVOT!



Izdavač:

Savez društava Vojvodine za borbu protiv raka
21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6/III
tel.: +381 21 66 11 619
web: www.vojvodina-cancer.org.rs
e-mail: info@vojvodina-cancer.org.rs

Autor:

Prof. dr sci. med. Zoran Radovanović, hirurg
Institut za onkologiju Vojvodine, klinika za operativnu onkologiju
21204 Sremska Kamenica, Institutski put 4
tel.: 021/48-05-532
e-mail: radovanovic.zoran@onk.ns.ac.rs
www.onk.ns.ac.rs

**NEMOJTE KRITI
SVOJE TEGOBE IZA
ZATVORENIH VRATA!**

RAK DEBELOG CREVA

Štampa: **Stalick**, Novi Sad



ELLE




ŠTA JE KOLOREKTALNI KARCINOM?

TO JE ZLOĆUDNI TUMOR (RAK) KOJI SE JAVLJA NA DEBELOM CREVU (LAT. COLON) I ZAVRŠNOM DELU DEBELOG CREVA (LAT. REKTUM).

Godišnje od raka debelog creva u svetu oboli 740 000 muškaraca i 610 000 žena, a umre oko 70 000 osoba, što je 9% svih umrlih od malignih tumora. Time je kolorektalni karcinom četvrti najčešći uzrok smrti od karcinoma u svetu.

Srbija je po učestalosti raka debelog creva na 22. mestu u Evropi i godišnje u našoj zemlji oboli oko 5000 osoba, od toga u Vojvodini 1200!

RANA DIJAGNOZA
KOLOREKTALNOG KARCINOMA
OMOGUĆAVA IZLEČENJE.



SIMPTOMI KOJI UKAZUJU NA MOGUĆI RAK DEBELOG CREVA:

- promene u pražnjenju creva (dugotrajni proliv ili opstipacija);
- osećaj nepotpunog pražnjenja;
- lažni pozivi na stolicu;
- pojava tanke stolice;
- krv u stolici;
- stalni osećaj nadutosti;
- gubitak na telesnoj težini bez nekog objašnjivog razloga;
- slabost i malaksalost.

JAVITE SE LEKARU AKO IMATE TEGOBE!


FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK RAKA DEBELOG CREVA:

- životna dob preko 50 godina: više od 90% pacijenata kod kojih se dijagnostikuje rak debelog creva je starije od 50 godina;
- polipi debelog creva;
- slučajevi raka debelog creva u porodici;
- genetske promene (familijarna polipoza, nasledni kolorektalni karcinom);
- bolesti debelog creva – ulcerozni kolitis i Kronova bolest;
- način ishrane (ishrana bogata mesom i mastima sa malim unosom voća i povrća);
- pušenje.

AKO IMATE PREKO 50 GODINA
RAZGOVARAJTE SA VAŠIM LEKAROM.

ŠTA JE SKRINING?

SKRINING PODRAZUMEVA DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE RADI RANOG OTKRIVANJA BOLESTI. OSOBA KOD KOJE SE KOLOREKTALNI KARCINOM OTKRIJE U RANOM STADIJUMU IMA PREKO 90% ŠANSE DA BUDE IZLEČENA.



Rak debelog creva najčešće nastaje iz polipa.

To su dobroćudni izraštaji koji se mogu pojaviti u crevu, a neki od njih nakon niza godina mogu se transformisati u karcinom.

SKRINING TESTOVIMA MOŽEMO:

- otkriti polipe i ukloniti ih pre nego što se transformišu u karcinom;
- otkriti karcinom u ranom stadijumu, te hirurškim i drugim vidovima lečenja kod najvećeg broja pacijenata postići izečenje od raka debelog creva.